



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 02.02.2021
Αριθμ. πρωτ: 433/12443

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 165
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

Προς: W. NEUDORFF GmbH KG, Γερμανία
(διά της υπεύθυνης επικοινωνίας,
εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και
ΣΙΑ Ε.Ε. – «AGRIBIZ»
Ξενίας 1, 115 27 – Αθήνα)
e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθμό 14488 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) SUPPORT 97,6 EC (paraffin oil 83% β/ο, CAS 8042-47-5) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσοнос σημασίας χρήσεις), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας».
5. Την Κατευθυντήρια Οδηγία SANTE 2019/12752 σχετικά με την παρέκταση και τις απαιτήσεις για τον καθορισμό των ΑΟΚ «ανώτατα όρια καταλοίπων».
6. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
8. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικών κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19.10.2020).
9. Τη με αριθ. πρωτ. 8817/96673/26.08.2014 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14488 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) SUPPORT 97,6 EC (paraffin oil 83% β/ο, CAS 8042-47-5), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Τις με αριθ. πρωτ. 433/12443/15.01.2021 και 14100/359609/23.12.2020 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Διευρύνουμε την με αριθμό 14488 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) SUPPORT 97,6 EC (paraffin oil 83% β/ο, CAS 8042-47-5), που χορηγήθηκε με την υπ. αριθ. πρωτ. 8817/96673/26.08.2014 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα (δράσης διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Συγκεκριμένα τα σημεία **5**, **11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ. ανά καλλ. περίοδο Μεσοδιάστημα εφαρμογών (σε ημέρες)
		κ.εκ. σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρ.)	κ.εκ. σκευάσματος / στρ		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Λεμονιά (CIDLI) Μανταρινιά (CIDRE) (Κλημεντίνες) Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	Κόκκινη ψώρα (<i>Aonidiella aurantii</i> - ΑΟΝΔΑΥ) Παρλατόρια (<i>Parlatoria pergandei</i> - PARLPE) και άλλες ψώρες	1000-1500	100- 220	1000-2240	Εφαρμογές πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών	1 – 2 />60
	Αλευρώδεις (<i>Dialeurodes citri</i> - DIALCI, <i>Aleurothrixus floccosus</i> - ALTHFL)	1000-1500	50-220	500-2240	Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών ή μία φθινοπωρινή	1 – 2 />60
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά (ΜΑΒSD), Αχλαδιά (ΡΥUCO)	Ψώρα Σαν-Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> -PARLPE) και άλλες ψώρες	750-1000	80-100	600-1000	Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών	1
	Κόκκινος τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i> - METTUL)	750-1000	125- 150	940-1500	Εφαρμογή πριν την άνθηση	
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερικοκιά (PRNAR), Κερασιά (PRNAV), Ροδακινιά (PRNPS),	Ψώρα Σαν-Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> -PARLPE) και άλλες ψώρες	750-1000	80-100	600-1000	Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος	1

Δαμασκηιά (PRNDO)					των καρπών	
	Κόκκινος και κίτρινος τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i> - METTUL)	750-1000	125	940-1250	Εφαρμογή πριν την άνθηση	
Ελιά (OLVEU)	Χρήσεις Ήσσοнос Σημασίας: Παρλατόρια (<i>Parlatoria oleae</i> *- PARLOL) Λεκάριο (<i>Saissetia oleae</i> *- SAISOL) Πολλίνια (<i>Pollinia pollini</i> *- POLNPO) Άσπρη ψώρα (<i>Aspidiotus nerii</i> *- ASPDNE) Μυτιλόμορφη ψώρα (<i>Lepidosaphes ulmi</i> *-LEPSUL) Ψώρες (<i>Leucaspis riccae</i> *- LEUARI) (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> *- CHRYDI) Ακάρεια (<i>Eriophyes vitis</i> *- ERPHVI) (<i>Tegolophus hassani</i> *-TEGLSP) (<i>Oxycenus maxwelli</i> *- OXYNMA) (<i>Eotetranychus carpini</i> *-EOTECA)	750-1000	80-150	600-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, από την πτώση των πετάλων ως μικρούς καρπούς	1
Ακτινιδιά* (ATIDE) Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Ψώρα Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidotus perniciosus</i> - QUADPE) Βαμβακάδα ή Διάσπις (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> - PSEAPE)	750-1000	80-150	600-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση και μετά τη συγκομιδή	2

	Μετκάλφα (<i>Metcalfa pruinosa</i> - METFPR) Βαμβακάδα (<i>Euphyllura sp.</i> - EUPHSP) Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR) Κόκκινος Τετράνυχος (<i>Metatetranychus ulmi</i> -METTUL)					
Αμυγδαλιά* PRNDU Καρυδιά* IUGRE Φιστικιά* PIAVE Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας	Κοκκοειδή Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> (QUADPE) Βαμβακάδα ή Διάσπιν <i>Pseudalacaspis pentagona</i> (PSEAPE) <i>Planococcus / Pseudococcus sp.</i> (PSECSP) Μυτιλόμορφη ψώρα <i>Lepidosaphes ulmi</i> (LEPSUL) Κόκκινη ψώρα <i>Aonidiella aurantii</i> (AONDAU) Κ.α. ψώρες <i>Sphaerolecanium prunastri</i> (LECAPN) <i>Eulecanium persicae</i> (LECAPE) <i>Melanaspis inopinata</i> (MELAIN) Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR)	750-1000	80-150	600-1500	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την ροζ κορυφή και μετά την συγκομιδή (BBCH 57-69 και BBCH 99)	2
<p>Παρατηρήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με το ύψος των φυτών και την ένταση της προσβολής. 2. Στα εσπεριδοειδή η συνιστώμενη δόση θα πρέπει να συνδυαστεί με το κατάλληλο όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπερβαίνεται η μέγιστη δόση/ στρ. 3. Κατά τη χρήση του σκευάσματος τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό. 						

4. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας, υπερβολικής υγρασίας και όταν υπάρχει παγετός.
5. Να μην γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα, την περίοδο της ανθοφορίας ή όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.
6. Να μην γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου.
7. Να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή σκευασμάτων με δ.ο. captan, folpet και dithianon σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας.
- *«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες ελιά, ακτινιδιά, **αμυγδαλιά, καρυδιά και φιστικιά** από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

11 Δηλώσεις προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν.

P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.

Sr1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/
Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Sr3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:
10 μέτρων σε Εσπεριδοειδή και σε όψιμες εφαρμογές σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ελιά, ακτινιδιά, **αμυγδαλιά, καρυδιά και φιστικιά.**
20 μέτρων σε πρώιμες εφαρμογές σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ελιά, ακτινιδιά, **αμυγδαλιά, καρυδιά και φιστικιά.**

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Λεμονιά, Μανταρινιά (Κλημεντίνες), Πορτοκαλιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά, Αχλαδιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Δαμασκηλιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
Ελιά, Ακτινιδιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φιστικιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος

B

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 8817/96673/26.08.2014 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ